

HEXXUS GEL FORMICHE

ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL'USO

Tipico prodotto: PT18 (Insetticida)**Autorizzazione del Ministero della Salute n.** IT/2018/00515/AUT**Categoria di utilizzatori:** Professionisti formati**Composizione:**

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01 %
Bitrex® (denatonio benzoato)	0,008 %
Coformulanti q.b. a	100 %

Indicazioni di pericolo: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**Consigli di prudenza:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.**Titolare dell'autorizzazione ed officina di produzione:** Laboratorios Enovaur S.L. C / Muntaner 179 3º 1ª - 08036 Barcellona (Spagna)**Distribuito da:** GENICCO S.r.l. - Via Umberto I, 1 - 20067 Triebano (MI) - Tel. 02 9818997

Lotto N. / del.: vedi timbro

Peso netto: 35 g **C** x 4**Validità:** 36 mesi

Misure di mitigazione del rischio: Non applicare in aree recentemente trattate con altri insetticidi. Per evitare fenomeni di resistenza, è consigliabile alternare trattamenti con prodotti basati su principi attivi con meccanismo d'azione differente. Il prodotto va utilizzato solo fino a completo controllo dell'infestazione. Usare il prodotto alle dosi e agli intervalli raccomandati. Per evitare rischi per l'ambiente, seguire le istruzioni e le modalità d'uso. Nel caso di applicazione attorno agli edifici, evitare l'applicazione nei pressi di scarichi o sistemi fognari. Nel caso di trattamenti in zone connesse a sistemi fognari, assicurarsi che il prodotto sia applicato in aree non soggette a rischio di esondazione o con ristagni d'acqua, in punti non raggiungibili dalla pioggia, da acque di lavaggio o da possibile dilavamento. Il prodotto deve essere applicato in modo sicuro per minimizzare il rischio di ingestione da parte di bambini o animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d'acqua, nel lavandino o in scarichi fognari. Non applicare su superfici destinate a preparazione, stoccaggio e/o consumo di alimenti o mangiami.

Misure di primo soccorso: In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.

Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.

IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVENELENI.

Misure di protezione ambientale: Evitare la contaminazione di scarichi, sistemi idrici superficiali e sotterranei, nonché del suolo. Recuperare il prodotto dalla superficie interessata e l'acqua di lavaggio utilizzata per il trattamento. In caso di fuoriuscita di acqua, evitare la diffusione utilizzando adeguati dispositivi di barriera. Il prodotto recuperato deve essere eliminato in conformità alla legislazione locale. Contattare le autorità competenti se la situazione non può essere controllata.

Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio: Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e gli appositi contenitori per esche secondo la normativa vigente. Il prodotto è stabile, all'interno del contenitore originale, fino a 3 anni se conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. È raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

HEXXUS GEL FORMICHE è un insetticida in formulazione gel efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*). Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto può essere applicato utilizzando siringhe per il controllo delle tre specie di formiche sopracitate. Per il controllo della formica argentina, il prodotto può essere posto all'interno di stazioni di adescamento. **HEXXUS GEL FORMICHE** può portare allergizzazione dell'intera colonia: il suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato *Trofalassi*, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

Modalità d'impiego: L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), il prodotto va applicato nei posti di maggiore presenza: grondaie, comicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature. Applicare in gocce o strisce dove si nota presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi.

HEXXUS GEL FORMICHE deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.

Dose: 0.2g/m2 (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)**Frequenza di applicazione:** dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.**Frequenza del trattamento:** il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

GENICCO SRL

35g e x 4**HEXXUS
GEL FORMICHE**

GENICCO SRL