

MAGNUM GEL FORMICHE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N.IT/2017/00442/MRP
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01 %
Bitrex® (Denatonium benzoato)	0,008 %
Coformulanti	q.b. a 100 %

FORMULAZIONE

Insetticida pronto all'uso (RTU) in formulazione gel, agisce per ingestione. Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che rende improbabile l'ingestione involontaria da parte dei bambini. **MAGNUM GEL FORMICHE** ha un effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, per consentire alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno detto *Trofallassi*, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

INFESTANTI BERSAGLIO

MAGNUM GEL FORMICHE è un insetticida efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*).

AMBIENTI D'USO

Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati).

ATTREZZATURE

- Pistola erogatrice
- Distributori di esca

DOSI CONSIGLIATE e CONSIGLI DI UTILIZZO

MAGNUM GEL FORMICHE deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.

Dose: 0.2 g/m² (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Il gel deve essere applicato nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per utilizzo in esterni (terrazze, patii, cortili o giardini), il prodotto va applicato nelle aree di maggiore presenza delle formiche: davanzali, battiscopa, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature.

L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. Non contaminare il gel con insetticidi tradizionali, non applicare su superfici trattate con insetticidi tradizionali da meno di 3-4 settimane.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE

Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi.

L'esca non deve essere posta in prossimità di alimenti, mangimi o bevande. Il prodotto deve essere maneggiato in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di assunzione da parte di bambini o animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d'acqua, nel lavandino o in scarichi fognari. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Non usare su legno o su superfici porose. Non esporre alla luce diretta del sole.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IA.012-14.09.2018



BIOCIDA

idoneo per il
Settore
Alimentare



SPECIE BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



PRODOTTI CORRELATI



Pistola erogatrice
SIMPLE



Pistola
APLIGEL



aghi per
cartucce gel



Erogatore
esca in gel

ATTENZIONE

Etichetta azzurra